


大腸癌

◆S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカルシウム)

S-1：40 mg/m²/回 1日2回 朝・夕食後 28日間内服 その後14日間休薬。


6週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day28		Day42
S-1 40 mg/m ² /回					

◆カペシタピン B法

カペシタピン：1250 mg/m²/回 1日2回 朝・夕食後 14日間内服 その後7日間休薬

3週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day14		Day21
カペシタピン 1250mg/m ² /回					

◆ホリナート・テガフル・ウラシル療法


テガフル：300～600 mg(300 mg/m²を基準)を1日3回に分けて内服

(約8時間毎。食事の前後1時間を避ける)

ホリナート：25 mg/回 1日3回(テガフル・ウラシルと同時に内服)

28日間内服し、その後7日間休薬

5週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day28		Day35
テガフル・ウラシル 300 mg/m ²					
ホリナート 25 mg/回					

◆CAPOX 療法(カペシタピン+オキサリプラチン)±ベバシズマブ




カペシタピン：1000 mg/m²/回 1日2回 朝・夕食後 14日間内服(Day1 夕～Day15 朝)

その後7日間休薬

オキサリプラチン：130 mg/m² Day1 2時間かけて点滴

± ベバシズマブ：7.5 mg/kg Day1 90分かけて(30分まで短縮可)

3週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day15		Day21
カペシタピン 1000mg/m ² /回					
オキサリプラチン 130mg/m ²					
ベバシズマブ 7.5 mg/kg					

◆SOX 療法(S-1+オキサリプラチン)±ベバシズマブ




S-1：40 mg/m²/回 1日2回 朝・夕食後 14日間内服(Day1 夕～Day15 朝)

その後7日間休薬

オキサリプラチン：130 mg/m² Day1 2時間かけて点滴

± ベバシズマブ：7.5 mg/kg Day1 90分かけて(30分まで短縮可)

3週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day15		Day21
S-1 40mg/m ² /回					
オキサリプラチン 130mg/m ²					
ベバシズマブ 7.5 mg/kg					

◆mFOLFOX6 療法(レボホリナート+オキサリプラチン+フルオロウラシル) ±ベバシズマブ

レボホリナート : 200 mg/m² Day1 2時間かけて点滴
 オキサリプラチン : 85 mg/m² Day1 2時間かけて点滴
 フルオロウラシル : 400 mg/m² Day1 急速静注
 フルオロウラシル : 2400 mg/m² Day1 46時間かけて点滴
 ± ベバシズマブ : 5mg/kg Day1 90分かけて(30分まで短縮可)
 2週を1コースとして繰り返す

	Day1	Day2	Day3		Day14
レボホリナート 200mg/m ²	↓				
オキサリプラチン 85mg/m ²	↓				
フルオロウラシル(急速静注) 400 mg/m ²	↓				
フルオロウラシル(持続静注) 2400 mg/m ²	→ 46時間持続				
ベバシズマブ 5 mg/kg	↓				

◆FOLFIRI 療法(レボホリナート+イリノテカン+フルオロウラシル) ±ベバシズマブ

レボホリナート : 200 mg/m² Day1 2時間かけて点滴
 イリノテカン : 150 mg/m² Day1 1.5時間かけて点滴
 フルオロウラシル : 400 mg/m² Day1 急速静注
 フルオロウラシル : 2400 mg/m² Day1 46時間かけて点滴
 ± ベバシズマブ : 5mg/kg Day1 90分かけて(30分まで短縮可)
 2週を1コースとして繰り返す

	Day1	Day2	Day3		Day14
レボホリナート 200mg/m ²	↓				
イリノテカン 150mg/m ²	↓				
フルオロウラシル(急速静注) 400 mg/m ²	↓				
フルオロウラシル(持続静注) 2400 mg/m ²	→ 46時間持続				
ベバシズマブ 5 mg/kg	↓				

◆CAPIRI(カペシタビン+イリノテカン)±ベバシズマブ

カペシタビン : 800 mg/m²/回 1日2回朝・夕食後 14日間内服し、その後7日間休薬

イリノテカン : 200 mg/m² Day1 1.5時間かけて点滴

± ベバシズマブ : 7.5 mg/kg Day1 90分かけて(30分まで短縮可)

3週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day15		Day21
カペシタビン 800mg/m ² /回					
イリノテカン 200mg/m ²					
ベバシズマブ 7.5mg/kg					

◆IRIS療法(S-1+イリノテカン)±ベバシズマブ

S-1 : 40 mg/m²/回 1日2回 朝・夕食後 14日間内服(Day1 夕~Day15 朝)

その後14日間休薬

イリノテカン : 125 mg/m² Day1、Day15 90分かけて点滴

± ベバシズマブ : 5 mg/kg Day1、Day15 90分かけて(30分まで短縮可)

4週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day15		Day28
S-1 40mg/m ² /回					
イリノテカン 125mg/m ²					
ベバシズマブ 5mg/kg					

◆ロンサーフ®(トリフルリジン・チピラシル塩酸塩)±ベバシズマブ

ロンサーフ® : 35 mg/m²/回 1日2回 5日内服し、2日休薬。

これを2回繰り返し、その後14日間休薬。

± ベバシズマブ : 5 mg/kg Day1、Day15 90分かけて(30分まで短縮可)


4週を1コースとして繰り返す

	Day1		Day5		Day8		Day12		Day14		Day28
ロンサーフ® 35mg/m ² /回											
ベバシズマブ 5mg/kg											

※詳細な投与量は添付文書を確認してください。

◆レゴラフェニブ

レゴラフェニブ：160 mg/回 1日1回食後に内服 3週間内服し、その後1週間休薬
4週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day21		Day28
レゴラフェニブ 160 mg/回					

◆パニツムマブ

パニツムマブ：6mg/kg 1時間かけて点滴
2週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day14
パニツムマブ 6mg/kg	