


膵臓癌

◆S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカルシウム)

S-1：40 mg/m²/回 1日2回 朝・夕食後 28日間内服 その後14日間休薬。




6週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day28		Day42
S-1 40 mg/m ² /回					

◆ゲムシタピン

ゲムシタピン：1000 mg/m² Day1、8、15 30分かけて点滴

4週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day8		Day15		Day28
ゲムシタピン 1000mg/m ²							

◆FOLFIRINOX療法(レボホリナート+オキサリプラチン+イリノテカン+フルオロウラシル)

オキサリプラチン：85 mg/m² Day1 2時間かけて点滴






レボホリナート：200 mg/m² Day1 2時間かけて点滴

イリノテカン：180 mg/m² Day1 90分かけて点滴

フルオロウラシル：400 mg/m² Day1 急速静注

フルオロウラシル：2400 mg/m² Day1 46時間かけて点滴

2週を1コースとして繰り返す

	Day1	Day2	Day3		Day14
オキサリプラチン 85mg/m ²					
レボホリナート 200mg/m ²					
イリノテカン 180 mg/m ²					
フルオロウラシル(急速静注) 400 mg/m ²					
フルオロウラシル(持続静注) 2400 mg/m ²					

◆Nab-PTX+ゲムシタピン(ナブパクリタキセル+ゲムシタピン)

ナブパクリタキセル：125 mg/m² Day1、Day8、Day15 30分かけて点滴

ゲムシタピン：1000 mg/m² Day1、Day8、Day15 30分かけて点滴

4週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day8		Day15		Day28
ナブパクリタキセル 125mg/m ²	↓		↓		↓		
ゲムシタピン 1000mg/m ²	↓		↓		↓		


◆GS療法(ゲムシタピン+S-1)

S-1：40 mg/m²/回 1日2回 朝・夕食後 14日間内服(Day1 夕~Day15 朝)

その後7日間休薬。

ゲムシタピン：1000 mg/m² Day1、Day8 30分かけて点滴

3週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day8		Day15		Day21
S-1 40 mg/m ² /回							
ゲムシタピン 1000 mg/m ²	↓		↓				