

## 膵臓癌

### ◆S-1(テガフル・ギメラシル・オテラシルカルシウム)

S-1 : 40 mg/m<sup>2</sup>/回 1日2回 朝・夕食後 28日間内服 その後14日間休薬。

6週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day28		Day42
S-1 40 mg/m <sup>2</sup> /回					

### ◆ゲムシタピン

ゲムシタピン : 1000 mg/m<sup>2</sup> Day1、8、15 30分かけて点滴

4週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day8		Day15		Day28
ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup>							

### ◆FOLFIRINOX療法(レボホリナート+オキサリプラチン+イリノテカン+フルオロウラシル)

オキサリプラチン : 85 mg/m<sup>2</sup> Day1 2時間かけて点滴


レボホリナート : 200 mg/m<sup>2</sup> Day1 2時間かけて点滴

イリノテカン : 180 mg/m<sup>2</sup> Day1 90分かけて点滴

フルオロウラシル : 400 mg/m<sup>2</sup> Day1 急速静注

フルオロウラシル : 2400 mg/m<sup>2</sup> Day1 46時間かけて点滴

2週を1コースとして繰り返す

	Day1	Day2	Day3		Day14
オキサリプラチン 85mg/m <sup>2</sup>					
レボホリナート 200mg/m <sup>2</sup>					
イリノテカン 180 mg/m <sup>2</sup>					
フルオロウラシル(急速静注) 400 mg/m <sup>2</sup>					
フルオロウラシル(持続静注) 2400 mg/m <sup>2</sup>					

◆Nab-PTX+ゲムシタピン(ナブパクリタキセル+ゲムシタピン)

ナブパクリタキセル：125 mg/m<sup>2</sup> Day1、Day8、Day15 30分かけて点滴

ゲムシタピン：1000 mg/m<sup>2</sup> Day1、Day8、Day15 30分かけて点滴

4週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day8		Day15		Day28
ナブパクリタキセル 125mg/m <sup>2</sup>	↓		↓		↓		
ゲムシタピン 1000mg/m <sup>2</sup>	↓		↓		↓		

◆GS療法(ゲムシタピン+S-1)

S-1：60 mg、80 mg、100 mg/日 1日2回 朝・夕食後 14日間内服(Day1 夕~Day15 朝)

その後7日間休薬。

ゲムシタピン：1000 mg/m<sup>2</sup> Day1、Day8 30分かけて点滴

3週間を1コースとして繰り返す

	Day1		Day8		Day15		Day21
S-1 60 mg/日 BSA<1.25 m <sup>2</sup> 80 mg/日 1.25 ≤ BSA < 1.50 m <sup>2</sup> 100 mg/日 1.50 m <sup>2</sup> ≤ BSA							
ゲムシタピン 1000 mg/m <sup>2</sup>	↓		↓				