




BV+SOX

BV(ベバシズマブ)+S-1(エスワン)+L-OHP(オキサリプラチン)

【適応】

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

【投与スケジュール】

	Day1		Day15		Day21
S-1 80mg/m ² ※ 分2					
BV 7.5mg/kg 90分かけて (初回)					
L-OHP 130mg/m ² 2時間かけて					

S-1はDay1の夕から服用開始し、14日間服用する(Day15の朝まで)。1週間休薬。

3週を1コースとする。

※BVは初回90分かけて投与。Infusion Reaction等なければ、2回目以降、60分、30分と短縮可能。

※BVによる重度(Grade3以上)のInfusion reactionが現れた場合、本剤の投与を中止し、以降、本剤を投与しないこと。またGrade2以下のInfusion reactionが現れた場合は、投与速度を減じて慎重に投与すること。

※S-1投与量

体表面積	投与量
1.25 m ² 未満	40mg/回
1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	50mg/回
1.5 m ² 以上	60mg/回

【S-1の減量の目安】

初回基準量	40mg/回	50mg/回	60mg/回
	休薬	40mg/回 →休薬	50mg/回 →40mg/回 →休薬

【腎障害時の投与量変更例】

◎S-1

Ccr (mL/min)	>80	50~80	30~50	<30
	減量なし	必要に応じて1段階減量投与量から開始	1段階以上の減量投与量から開始	投与不可