

BV+ロンサーフ®

BV(ベバシズマブ)+TAS-102(ロンサーフ®)

【適応】

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

【投与スケジュール】

| | Day1 | Day5 | Day6・7 | Day8 | Day12 | Day13・14 | Day15 | Day21 |
|--|------|------|--------|------|-------|----------|-------|-------|
| TAS-102 35 mg/m ² ※ 分 2 | → | | | → | | | | |
| BV 5mg/kg 90 分かけて (初回) | ↓ | | | | | | ↓ | |

TAS-102 は 1 日 2 回 朝・夕食後を 5 日間内服し、2 日間休薬。これを 2 回繰り返す、その後 14 日間休薬する。4 週を 1 コースとする。

BV は 2 週間ごとに点滴静注する。

※BV は初回 90 分かけて投与。Infusion Reaction 等なければ、2 回目以降、60 分、30 分と短縮可能。

※BV による重度 (Grade3 以上) の Infusion reaction が現れた場合、本剤の投与を中止し、以降、本剤を投与しないこと。また Grade2 以下の Infusion reaction が現れた場合は、投与速度を減じて慎重に投与すること。

※ロンサーフの投与量について

| 体表面積 | 通常量 |
|---|-------------------|
| 1.07 m ² 未満 | 35 mg/回 (70mg/日) |
| 1.07 m ² 以上 1.23 m ² 未満 | 40 mg/回 (80mg/日) |
| 1.23 m ² 以上 1.38 m ² 未満 | 45 mg/回 (90mg/日) |
| 1.38 m ² 以上 1.53 m ² 未満 | 50 mg/回 (100mg/日) |
| 1.53 m ² 以上 1.69 m ² 未満 | 55 mg/回 (110mg/日) |
| 1.69 m ² 以上 1.84 m ² 未満 | 60 mg/回 (120mg/日) |
| 1.84 m ² 以上 1.99 m ² 未満 | 65 mg/回 (130mg/日) |
| 1.99 m ² 以上 2.15 m ² 未満 | 70 mg/回 (140mg/日) |
| 2.15 m ² 以上 | 75 mg/回 (150mg/日) |

前コース (休薬期間を含む) 中に、「減量基準」に該当する有害事象が発現した場合には、本剤の投与再開時において、コース単位で 1 日単位量として 10mg/日単位で減量する。ただし、最低投与量は 30mg/日までとする

※骨髄抑制が現れることがあるため Day21 での血液検査が推奨されている。

<ロンサーフの減量基準>

| | 減量基準 |
|-----|----------------------------|
| 好中球 | 500/mm ³ 未満 |
| 血小板 | 50, 000/mm ³ 未満 |