

Cmab+FOLFIRI (GARNET 試験)

Cmab(アービタックス[®]) + I-LV(レボホリナート) + CPT-11(イリノテカン)
+5-FU

【適応】

RAS 遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
(RAS (KRAS 及び NRAS) 遺伝子変異の患者は適応外)

【投与スケジュール】

Day1

5-FU ボーラス
400mg/m² (15 分)

Day2

Cmab 500mg/m ² (2 時間)	I-LV 200mg/m ² (2 時間)	5-FU 持続静注 2400mg/m ² (46 時間)
	CPT-11 150mg/m ² (1.5 時間)	

2 週を 1 コースとする。

※Cmab による重度 (Grade3 以上) の Infusion reaction が現れた場合、本剤の投与を中止し、以降、本剤を投与しないこと。また Grade2 以下の Infusion reaction が現れた場合は、投与速度を減じて慎重に投与すること。

※減量投与量レベル

重傷 (Grade3 以上) の皮膚症状が発現した場合には、次表に従い Cmab の投与量を調節すること。

レベル	本剤の投与	投与延期後の状態	Cmab
初回発現時	投与延期	Grade2 以下に回復	250mg/m ² で投与継続
		回復せず	投与中止
2 回目発現時	投与延期	Grade2 以下に回復	200mg/m ² で投与継続
		回復せず	投与中止
3 回目発現時	投与延期	Grade2 以下に回復	150mg/m ²
		回復せず	150mg/投与中止
4 回目発現時	投与中止	-	-