

Cmab+mFOLFOX6

Cmab(アービタックス®)+I-LV(レボホリナート)+L-OHP(オキサリプラチン)+5-FU

【適応】

RAS遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
(RAS (KRAS及びNRAS) 遺伝子変異の患者は適応外)

【投与スケジュール】

Day1

5-FU ポーラス
400mg/m²(15分)

Day2

Cmab 500mg/m ² (2時間)	I-LV 200mg/m ² (2時間)	5-FU 持続静注 2400mg/m ² (46時間)
	L-OHP 85mg/m ² (2時間)	

2週を1コースとする。(PD: 憎悪まで)

※Cmabによる重度(Grade3以上)のInfusion reactionが現れた場合、本剤の投与を中止し、以降、本剤を投与しないこと。またGrade2以下のInfusion reactionが現れた場合は、投与速度を減じて慎重に投与すること。

※減量投与量レベル

重傷(Grade3以上)の皮膚症状が発現した場合には、次表に従いCmabの投与量を調節すること。

レベル	本剤の投与	投与延期後の状態	Cmab
初回発現時	投与延期	Grade2以下に回復	250mg/m ² で投与継続
		回復せず	投与中止
2回目発現時	投与延期	Grade2以下に回復	200mg/m ² で投与継続
		回復せず	投与中止
3回目発現時	投与延期	Grade2以下に回復	150mg/m ² で投与継続
		回復せず	投与中止
4回目発現時	投与中止	-	-