

Cmab 単独

Cmab(アービタックス®)

【適応】

RAS 遺伝子野生型の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
(RAS (KRAS 及び NRAS) 遺伝子変異の患者は適応外。)

【投与スケジュール】

	Day1		Day8		Day15	...
Cmab (初回) 400mg/m ² (2回目以降) 250mg/m ²	↓		↓		↓	

週1回点滴静注を行う。

※重度(Grade3以上)の Infusion reaction が現れた場合、本剤の投与を中止し、以降、本剤を投与しないこと。また Grade2 以下の Infusion reaction が現れた場合は、投与速度を減じて慎重に投与すること。

Day1

抗アレルギー薬 15分	Cmab 400mg/m ² 2時間かけて	生食 250mL 1時間かけて
----------------	-------------------------------------	-----------------

Day8、15、22、...

抗アレルギー薬 15分	Cmab 250mg/m ² 1時間かけて	生食 250mL 1時間かけて
----------------	-------------------------------------	-----------------

※Cmab 投与量

重傷(Grade3以上)の皮膚症状が発現した場合には、次表に従い本剤の投与量を調節すること。

Grade3以上の皮膚症状の発現回数	本剤の投与	投与延期後の状態	本剤の用量調節
初回発現時	投与延期	Grade2以下に回復	250mg/m ² で投与継続
		回復せず	投与中止
2回目の発現時	投与延期	Grade2以下に回復	200mg/m ² で投与継続
		回復せず	投与中止
3回目の発現時	投与延期	Grade2以下に回復	150mg/m ² で投与継続
		回復せず	投与中止
4回目の発現時	投与中止		

【投与スケジュール】

	Day1		Day15		Day29	...
Cmab 500mg/m ² 2時間かけて	↓		↓		↓	

2週に1回点滴静注を行う。

Grade3以上の皮膚症状の発現回数	本剤の投与	投与延期後の状態	本剤の用量調節
初回発現時	投与延期	Grade2以下に回復	500mg/m ² で投与継続
		回復せず	投与中止
2回目の発現時	投与延期	Grade2以下に回復	400mg/m ² で投与継続
		回復せず	投与中止
3回目の発現時	投与延期	Grade2以下に回復	300mg/m ² で投与継続
		回復せず	投与中止
4回目の発現時	投与中止		