

GS

GEM(ゲムシタビン)+S-1(エスワン)

【適応】

切除不能または再発胆道がん

【投与スケジュール】

	Day1		Day8		Day14		Day21
S-1 60mg-100mg/day ※ 分2							
GEM 1000mg/m ² 30分かけて							

S-1はDay1～14までの2週間服用し、Day1、8にGEMを投与する。その後、1週間休薬する。

3週を1コースとして繰り返す。

注意：GEMを30分以上かけて投与した場合、副作用が強く現れるケースがある。

※S-1投与量：開始用量が通常より1段階少ないことに注意

体表面積	投与量
1.25 m ² 未満	30mg/回
1.25 m ² 以上 1.5 m ² 未満	40mg/回
1.5 m ² 以上	50mg/回

【S-1の減量方法】

体表面積	初回投与量 (朝-夕)	1段階減量 (朝-夕)	2段階減量
1.25 m ² 未満	60mg/day (40mg-20mg)	50mg/day (25mg-25mg)	中止
1.25-1.5 m ²	80mg/day (40mg-40mg)	60mg/day (40mg-20mg)	
1.5 m ² 以上	100mg/day (50mg-50mg)	80mg/day (40mg-40mg)	

【腎障害時の投与量変更例】

◎S-1

Ccr (mL/min)	>80	50~80	30~50	<30
	減量なし	必要に応じて1段階減量投与量から開始	1段階以上の減量投与量から開始	投与不可

【GEM 減量方法】

初回投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量
1000mg/m ²	800mg/m ²	600mg/m ²	中止