

PTX B法(食道がん)

PTX(パクリタキセル)

【適応】

切除不能進行・再発食道がん

【投与スケジュール】

	Day1	Day8	Day15	Day22	Day29	Day36	Day43	Day49
PTX 100 mg/m ² 60分	↓	↓	↓	↓	↓	↓		

週1回投与を6週連続し、7週目は休薬する。これを1コースとして繰り返す。

※PTX投与時、PVC(DEHP)フリーでインラインフィルターの点滴ルートを用いて投与すること。

※PTX投与は原則自然滴下で行うこと。

(1滴の大きさが小さく、ポンプを使用した場合は滴下速度がずれる可能性がある。)

※乳がん・胃がんで使用するPTX(B法)と投与スケジュール・投与量が異なる。

【前投薬について】

PTX投与30分まえまでに、投与終了すること。

① デキサメタゾン(デキサート) 6.6mg※

② ファモチジン 20mg

③ ジフェンヒドラミン(レスタミンコーワ錠)50mg po or クロルフェニラミン(ポララミン)5mg

※初回投与時は6.6mg(2mL)とし、次回投与時までには過敏症状の発現が見られなかった場合、または臨床
上特に問題のない過敏症状の場合は、2週目の投与より半量3.3mg(1mL)に減量してもよい。以降の投与
週においても、過敏症状が見られない場合は、半量ずつ、0.825mg(0.25mL)まで減量し、投与してもよ
い。