

RAM+PTX

RAM(ラムシルマブ)+PTX(パクリタキセル)

【適応】

治癒切除不能な進行・再発の胃がん

【投与スケジュール】

	Day1		Day8		Day15	…Day28
RAM 8mg/kg	↓				↓	
PTX 80mg/m ² 60分	↓		↓		↓	

RAMは2週間に1回投与、PTXは週1回投与を3週連続し、4週目は休薬する。

4週を1コースとして繰り返す。

※RAM・PTX投与時、0.2又は0.22μのインラインフィルターのある点滴ルートを用いて投与すること。

※PTXはDEHPフリーの点滴ルートを使用すること。

※PTX投与は自然滴下で行うこと。

(1滴の大きさが小さく、ポンプを使用した場合は滴下速度がずれる可能性がある。)

【前投薬について】

PTX投与30分まえまでに、投与終了すること。

① デキサメタゾン(デキサート) 6.6mg※

② ファモチジン 20mg

③ ジフェンヒドラミン(レスタミンコーワ錠)50mg po or クロルフェニラミン(ポララミン)5mg

※初回投与時は6.6mg(2mL)とし、次回投与時までには過敏症状の発現が見られなかった場合、または臨床
上特に問題のない過敏症状の場合は、2週目の投与より半量3.3mg(1mL)に減量してもよい。以降の投与
週においても、過敏症状が見られない場合は、半量ずつ、0.825mg(0.25mL)まで減量し、投与してもよ
い。