

S-1+DTX


S-1(エスワン)+DTX(ドセタキセル)

【適応】



胃がん (StageⅢ 術後補助化学療法)

【投与スケジュール】

1 コース目

	Day1		Day14		Day21
S-1 80mg/m ² ※ 分 2					

2-7 コース

	Day1		Day14		Day21
DTX 40mg/m ² 1 時間かけて					
S-1 80mg/m ² ※ 分 2					


S-1 は Day1 の夕から服用開始し、14 日間服用する (Day15 の朝まで)。1 週間休薬。

3 週を 1 コースとする。

※DTX 投与は原則自然滴下で行うこと。

(1 滴の大きさが小さく、ポンプを使用した場合は滴下速度がずれる可能性がある。)

8 コース目以降～手術後 1 年まで

	Day1		Day28		Day42
S-1 80mg/m ² ※ 分 2					

S-1 は Day1 の夕から服用開始し、28 日間服用する (Day29 の朝まで)。2 週間休薬。

6 週を 1 コースとする。

※S-1 投与量

体表面積	投与量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上 1. 5m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

【S-1 の減量の目安】

初回基準量	40mg/回	50mg/回	60mg/回
	休薬	40mg/回 →休薬	50mg/回 →40mg/回 →休薬

【腎障害時の投与量変更例】

◎S-1

Ccr (mL/min)	>80	50~80	30~50	<30
	減量なし	必要に応じて1段階減量投与量から開始	1段階以上の減量投与量から開始	投与不可

減量方法

	DTX
1段階減量	35mg/m ²
2段階減量	30mg/m ²

有害事象がどちらかの薬剤に起因するものか判断可能な場合は、そちらの薬剤のみを減量可能