

SP

S-1(エスワン)+CDDP(シスプラチン)

【適応】

手術不能または再発胃がん

【投与スケジュール】

	Day1		Day8		Day21		Day35
S-1 80mg/m ² ※ 分2	→						
CDDP 60mg/m ² 2時間かけて			↓				

TS-1 は Day1～21 までの 3 週間服用し、Day8 に CDDP を投与する。その後、2 週間休薬する。

5 週を 1 コースとして繰り返す。

※S-1 投与量

体表面積	投与量
1. 25m ² 未満	40mg/回
1. 25m ² 以上 1. 5m ² 未満	50mg/回
1. 5m ² 以上	60mg/回

【S-1 の減量の目安】

初回基準量	40mg/回	50mg/回	60mg/回
	休薬	40mg/回 →休薬	50mg/回 →40mg/回 →休薬

【腎障害時の投与量変更例】

◎S-1

Ccr (mL/min)	>80	50～80	30～50	<30
	減量なし	必要に応じて 1 段階減量投与量から開始	1 段階以上の減量投与量から開始	投与不可

<CDDP> 腎障害時の減量方法

CCr (mL/min)	61 以上	60-46	45-31	30 以下
	減量なし	75%に減量	50%に減量	禁忌だが、 必要な場合は 50%に減量して投与