

RAM

RAM(ラムシルマブ)

【適応】

治癒切除不能な進行・再発の胃がん（2次治療以降に使用する）

【投与スケジュール】

	Day1		Day15		Day29	...
RAM 8mg/kg 60分 (忍容性があれば2回目以降は30分まで短縮可)	↓		↓		↓	

RAMは2週間に1回投与を繰り返す。

※本剤の投与にあたっては、インラインフィルター(0.2または0.22 μ)を使用すること。

※重度(Grade3以上)のInfusion reactionが現れた場合、本剤の投与を中止し、以降、本剤を投与しないこと。またGrade2以下のInfusion reactionが現れた場合は、投与速度を減じて慎重に投与すること。

<RAM減量の目安>

		1回目	2回目	3回目
蛋白尿	2-3g /日	休薬し回復後6mg/kgで再開 (2週間以上回復しない場合は中止)	休薬し回復後5mg/kgで再開 (2週間以上回復しない場合は中止)	中止
	>3g/日	中止	-	-
高血圧	≤Grade3 有症状	休薬し回復後6mg/kgで再開	休薬し回復後5mg/kgで再開	中止
	Grade3 無症状で2週間以上継続	休薬し回復後6mg/kgで再開	休薬し回復後5mg/kgで再開	中止
	Grade4	中止	-	-
Infusion reaction	Grade3-4	中止	-	-
その他	Grade3	休薬し回復後同量再開	休薬し回復後6mg/kgで再開	休薬し回復後5mg/kgで再開
	Grade4 (発熱・臨床検査値異常)	休薬し回復後同量再開	休薬し回復後6mg/kgで再開	休薬し回復後5mg/kgで再開
	Grade4 (上記以外)	中止	-	-