

RAM+FOLFIRI

RAM(サイラムザ®)+I-LV(レボホリナート)+CPT-11(イリノテカン)+5-FU

【適応】

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

【投与スケジュール】

Day1

5-FU ポーラス
400mg/m² (15 分)

Day2

RAM 8mg/kg (60 分)	I-LV 200mg/m ² (2 時間)	5-FU 持続静注 2400mg/m ² (46 時間)
	CPT-11 150mg/m ² (1.5 時)	

2 週を 1 コースとする。

※RAM 投与後、生食 100mL 投与あり。1 回目・2 回目は 60 分で投与。Infusion Reaction 等なければ、3 回目以降、全開で投与可能。

※RAM による重度 (Grade3 以上) の Infusion reaction が現れた場合、本剤の投与を中止し、以降、本剤を投与しないこと。また Grade2 以下の Infusion reaction が現れた場合は、投与速度を減じて慎重に投与すること。

<RAM 減量の目安>

		1 回目	2 回目	3 回目
蛋白尿	2-3g /日	休薬し回復後 6mg/kg で再開 (2 週間以上回復しない 場合は中止)	休薬し回復後 5mg/kg で再開 (2 週間以上回復しない 場合は中止)	中止
	>3g/日	中止	-	-
高血圧	≤Grade3 有症状	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復後 5mg/kg で再開	中止
	Grade3 無症状で 2 週 間以上継続	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復後 5mg/kg で再開	中止
	Grade4	中止	-	-
Infusion reaction	Grade3-4	中止	-	-
	Grade3	休薬し回復後同量再開	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復 後 5mg/kg で再開

その他	Grade4 (発熱・臨床検査値異常)	休薬し回復後同量再開	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復後 5mg/kg で再開
	Grade4 (上記以外)	中止	-	-