


Ramucirumab 単独療法

Ramucirumab(サイラムザ®)

【適応】

がん化学療法後に増悪した血清 AFP 値が 400ng/mL 以上の切除不能な肝細胞がん

【投与スケジュール】

	Day1	Day14
Ramucirumab 8mg/kg 60 分*		

2 週ごと。これを 1 コースとして PD (憎悪まで) 繰り返す。

*初回投与の忍容性が良好であれば、2 回目以降の投与時間は 30 分まで短縮できる。

【前投与】

抗ヒスタミン薬（ジフェンヒドラミンなど）の投与を考慮する

<RAM 減量の目安>

		1 回目	2 回目	3 回目
蛋白尿	2-3g /日	休薬し回復後 6mg/kg で再開 (2 週間以上回復しない 場合は中止)	休薬し回復後 5mg/kg で再開 (2 週間以上回復しない 場合は中止)	中止
	>3g/日	中止	-	-
高血圧	≤Grade3 有症状	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復後 5mg/kg で再開	中止
	Grade3 無症状で 2 週 間以上継続	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復後 5mg/kg で再開	中止
	Grade4	中止	-	-
Infusion reaction	Grade3-4	中止	-	-
その他	Grade3	休薬し回復後同量再開	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復 後 5mg/kg で再開
	Grade4 (発熱・臨床検 査値異常)	休薬し回復後同量再開	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復 後 5mg/kg で再開
	Grade4 (上記以外)	中止	-	-