

EC+mFOLFOX6

Encorafenib (ビラフトビ®) +Cmab(アービラックス®)
 + I-LV(レボホリナート)+L-OHP(オキサリプラチン)+5-FU

【適応】

BRAF V600E 変異陽性進行・再発大腸癌の1次治療

【投与スケジュール】

Day1

5-FU ポーラス
 400mg/m²(15分)

Day2

Cmab 500mg/m ² (2時間)	I-LV 200mg/m ² (2時間)	5-FU 持続静注 2400mg/m ² (46時間)
	L-OHP 85mg/m ² (2時間)	

Encorafenib 300mg/回 1日1回 連日経口 day1~

2週を1コースとする。

※Cmabによる重度(Grade3以上)の Infusion reaction が現れた場合、本剤の投与を中止し、以降、本剤を投与しないこと。また Grade2 以下の Infusion reaction が現れた場合は、投与速度を減じて慎重に投与すること。

用量	Encorafenib	Cmab	L-OHP	5FU ポーラス (持続)
初回投与量	300mg	500mg/m ²	85mg/m ²	400mg (2400mg) /m ²
1段階減量	225mg	400mg/m ²	65mg/m ²	200mg (1920mg) /m ²
2段階減量	150mg	300mg/m ²	50mg/m ²	中止 (1600mg) /m ²
3段階減量	-	-	40mg/m ²	中止 (1360mg) /m ²

Encorafenib:Grade2以上の皮膚炎は休業