

# FOLFIRI+RAM

I-LV(レボホリナート)+CPT-11(イリノテカン)+5-FU+ RAM(サイラムザ®)

## 【適応】

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

## 【投与スケジュール】

Day1

Day2

5-FU ポーラス  
400mg/m<sup>2</sup> (15分)

RAM 8mg/kg (60分)	I-LV 200mg/m <sup>2</sup> (2時間)	5-FU 持続静注 2400mg/m <sup>2</sup> (46時間)
	CPT-11 150mg/m <sup>2</sup> (1.5時)	

2週を1コースとする。

※RAM投与後、生食100mL投与あり。1回目・2回目は60分で投与。Infusion Reaction等なければ、3回目以降、全開で投与可能。

※RAMによる重度(Grade3以上)のInfusion reactionが現れた場合、本剤の投与を中止し、以降、本剤を投与しないこと。またGrade2以下のInfusion reactionが現れた場合は、投与速度を減じて慎重に投与すること。

## <RAM 減量の目安>

		1回目	2回目	3回目
蛋白尿	2-3g /日	休薬し回復後 6mg/kg で再開 (2週間以上回復しない場合は中止)	休薬し回復後 5mg/kg で再開 (2週間以上回復しない場合は中止)	中止
	>3g/日	中止	-	-
高血圧	≤Grade3 有症状	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復後 5mg/kg で再開	中止
	Grade3 無症状で2週間以上継続	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復後 5mg/kg で再開	中止
	Grade4	中止	-	-
Infusion reaction	Grade3-4	中止	-	-
	Grade3	休薬し回復後同量再開	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復後 5mg/kg で再開

その他	Grade4 (発熱・臨床検査値異常)	休薬し回復後同量再開	休薬し回復後 6mg/kg で再開	休薬し回復後 5mg/kg で再開
	Grade4 (上記以外)	中止	-	-