

# GS

## GEM(ゲムシタビン)+S-1(エスワン)

### 【適応】

切除不能または再発胆道がん

### 【投与スケジュール】

	Day1		Day8		Day14		Day21
S-1 60mg-100mg/day ※ 分2							
GEM 1000mg/m <sup>2</sup> 30分かけて							

S-1 は Day1~14 までの 2 週間服用し、Day1、8 に GEM を投与する。その後、1 週間休薬する。

3 週を 1 コースとして繰り返す。

注意：GEM を 30 分以上かけて投与した場合、副作用が強く現れるケースがある。

### ※S-1 投与量：開始用量が通常より 1 段階少ないことに注意

体表面積	投与量
1.25 m <sup>2</sup> 未満	30mg/回
1.25 m <sup>2</sup> 以上 1.5 m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	50mg/回

### 【S-1 の減量方法】

体表面積	初回投与量 (朝-夕)	1 段階減量 (朝-夕)	2 段階減量
1.25 m <sup>2</sup> 未満	60mg/day (40mg-20mg)	50mg/day (25mg-25mg)	中止
1.25-1.5 m <sup>2</sup>	80mg/day (40mg-40mg)	60mg/day (40mg-20mg)	
1.5 m <sup>2</sup> 以上	100mg/day (50mg-50mg)	80mg/day (40mg-40mg)	

【腎障害時の投与量変更例】

◎S-1

Ccr (mL/min)	>80	50~80	30~50	<30
	減量なし	必要に応じて1段階減量投与量から開始	1段階以上の減量投与量から開始	投与不可

【GEM 減量方法】

初回投与量	1段階減量	2段階減量	3段階減量
1000mg/m <sup>2</sup>	800mg/m <sup>2</sup>	600mg/m <sup>2</sup>	中止