

# Ramucirumab 単独療法

## Ramucirumab(サイラムザ®)

### 【適応】

がん化学療法後に増悪した血清 AFP 値が 400ng/mL 以上の切除不能な肝細胞がん

### 【投与スケジュール】

|                                | Day1 | Day14 |
|--------------------------------|------|-------|
| Ramucirumab<br>8mg/kg<br>60 分* | ↓    |       |

2 週ごと。これを 1 コースとして PD (憎悪まで) 繰り返す。

\*初回投与の忍容性が良好であれば、2 回目以降の投与時間は 30 分まで短縮できる。

### 【前投与】

抗ヒスタミン薬（ジフェンヒドラミンなど）の投与を考慮する

＜RAM 減量の目安＞

|                      |                             | 1 回目                                        | 2 回目                                        | 3 回目                     |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 蛋白尿                  | 2-3g /日                     | 休薬し回復後 6mg/kg で再開<br>(2 週間以上回復しない<br>場合は中止) | 休薬し回復後 5mg/kg で再開<br>(2 週間以上回復しない<br>場合は中止) | 中止                       |
|                      | >3g/日                       | 中止                                          | －                                           | －                        |
| 高血圧                  | ≤Grade3<br>有症状              | 休薬し回復後 6mg/kg で再開                           | 休薬し回復後 5mg/kg で再開                           | 中止                       |
|                      | Grade3<br>無症状で 2 週<br>間以上継続 | 休薬し回復後 6mg/kg で再開                           | 休薬し回復後 5mg/kg で再開                           | 中止                       |
|                      | Grade4                      | 中止                                          | －                                           | －                        |
| Infusion<br>reaction | Grade3-4                    | 中止                                          | －                                           | －                        |
| その他                  | Grade3                      | 休薬し回復後同量再開                                  | 休薬し回復後 6mg/kg で再開                           | 休薬し回復<br>後 5mg/kg<br>で再開 |
|                      | Grade4<br>(発熱・臨床検<br>査値異常)  | 休薬し回復後同量再開                                  | 休薬し回復後 6mg/kg で再開                           | 休薬し回復<br>後 5mg/kg<br>で再開 |
|                      | Grade4<br>(上記以外)            | 中止                                          | －                                           | －                        |