

# S-1 + BV

## S-1(エスワン) + BV(ベバシズマブ)

### 【適応】

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

### 【投与スケジュール】

	Day1		Day15		Day21
S-1 80mg/m <sup>2</sup> ※ 分2					
BV 7.5mg/kg 90分かけて (初回)					

S-1 は Day1 の夕から服用開始し、14 日間服用する (Day15 の朝まで)。1 週間休薬。  
3 週を 1 コースとする。

※BV は初回 90 分かけて投与。Infusion Reaction 等なければ、2 回目以降、60 分、30 分と短縮可能。  
※BV による重度 (Grade3 以上) の Infusion reaction が現れた場合、本剤の投与を中止し、以降、本剤を投与しないこと。また Grade2 以下の Infusion reaction が現れた場合は、投与速度を減じて慎重に投与すること。

### ※S-1 投与量

体表面積	投与量
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25 m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

### 【S-1 の減量の目安】

初回基準量	40mg/回	50mg/回	60mg/回
	休薬	40mg/回 →休薬	50mg/回 →40mg/回 →休薬

【腎障害時の投与量変更例】

◎S-1

Ccr (mL/min)	>80	50~80	30~50	<30
	減量なし	必要に応じて1段階減量投与量から開始	1段階以上の減量投与量から開始	投与不可