

# SOX + Pembrolizumab 療法

S-1(エスワン)+L-OHP(オキサリプラチン)+Pembrolizumab(キイトルーダ®)

## 【適応】

PD-L1 陽性 (CPS $\geq$ 1) かつ HER2 陰性が確認された進行・再発胃がん

## 【投与スケジュール】

	Day1		Day15		Day21
S-1 80mg/m <sup>2</sup> ※ 分 2					
L-OHP 130mg/m <sup>2</sup> 2 時間かけて					
Pembrolizumab 200mg/body 30 分かけて					

S-1 は Day1 の夕から服用開始し、14 日間服用する (Day15 の朝まで)。その後 1 週間休薬。

3 週を 1 コースとする。

## ※S-1 投与量

体表面積	投与量
1.25 m <sup>2</sup> 未満	40mg/回
1.25 m <sup>2</sup> 以上 1.5 m <sup>2</sup> 未満	50mg/回
1.5 m <sup>2</sup> 以上	60mg/回

## 【S-1 の減量の目安】

初回基準量	40mg/回	50mg/回	60mg/回
	休薬	40mg/回 →休薬	50mg/回 →40mg/回 →休薬

## 【腎障害時の投与量変更例】

### ◎S-1

Ccr (mL/min)	>80	50~80	30~50	<30
	減量なし	必要に応じて 1 段階減量投与量から開始	1 段階以上の減量投与量から開始	投与不可