

SOX 療法(胃がん) + Pembrolizumab + Tmab

S-1(エスワン)+L-OHP(オキサリプラチン)+Pembrolizumab(キイトルーダ®)+Tmab(トラスツズマブ)

【適応】

HER2 陽性治癒切除不能な進行・再発胃がんの一次治療

CPS1 以上 (検査抗体 22C3 で測定)

【投与スケジュール】

	Day1		Day15		Day21
Pembrolizumab 200mg/body 30 分かけて	↓				
Tmab 初回 8 mg/kg 2 回目以降 6 mg/kg	↓				
L-OHP※1 130mg/m ² 2 時間かけて	↓				
S-1 80mg/m ² ※2 分 2		→			

S-1 は Day1 の夕から服用開始し、14 日間服用する (Day15 の朝まで)。1 週間休薬。

3 週を 1 コースとする。

※1. オキサリプラチンの投与は 6~8 サイクルまで

※2. S-1 投与量

体表面積	投与量
1. 25 m ² 未満	40mg/回
1. 25 m ² 以上 1. 5 m ² 未満	50mg/回
1. 5 m ² 以上	60mg/回

【S-1 の減量の目安】

初回基準量	40mg/回	50mg/回	60mg/回
	休薬	40mg/回 →休薬	50mg/回 →40mg/回 →休薬

【腎障害時の投与量変更例】

◎S-1

Ccr (mL/min)	>80	50~80	30~50	<30
	減量なし	必要に応じて1段階減量投与量から開始	1段階以上の減量投与量から開始	投与不可