

nab-PTX+GEM

nab-PTX(アルブミン懸濁型パクリタキセル)+GEM(ゲムシタビン)

【適応】

PS 0-1 の治癒切除不能な膵臓がん

【投与スケジュール】

	Day1		Day8		Day15		Day28
nab-PTX 125mg/m ² 30分	↓		↓		↓		
GEM 1000mg/m ² 30分	↓		↓		↓		

週1回投与を3週連続し、4週目は休薬する。これを1コースとして繰り返す。

※ GEMについて30分以上かけて投与した場合、副作用が強く現れるケースがある。

※ 添加剤としてアルブミンを含有しているため、特定生物由来製品に分類される。使用開始前に血液製剤使用同意書が必要。

※ インラインフィルターの使用禁止(アルブミン懸濁製剤のため、フィルタに目詰まりを起こすため)。

適正使用について

●1日目(各コース開始時)

好中球数および血小板数の変動に十分留意し、投与前の臨床検査で好中球数が1500/mm³未滿又は血小板数が10万/mm³未滿であれば、骨髓機能が回復するまで投与を延期すること。

●8日目

- ①好中球数1000超かつ血小板数7.5万以上 →投与量変更なし
- ②好中球数500~1000又は血小板数5から7.5万未滿 →1段階減量
- ③好中球数500未滿又は血小板数5万未滿 →1休薬

●15日目

- 1)好中球数1000超かつ血小板数7.5万以上
 - 8日目が① →投与量変更なし
 - 8日目が② →第1日目の投与量に増量
 - 8日目が③ →1段階減量
- 2)好中球数500~1000又は血小板数5から7.5万未滿
 - 8日目が① →投与量変更なし
 - 8日目が② →8日目投与量に同じ
 - 8日目が③ →1段階減量
- 3)好中球数500未滿又は血小板数5万未滿
 - 8日目が①~③ →休薬

減量の目安

Nab-PTX 通常投与量 125mg/m²

1 段階減量 100mg/m²

2 段階減量 75mg/m²

※高度 (Grade3) 末梢神経障害のときは減量

(Grade2 以下であっても減量を考慮しても良い)