

# ロンサーフ®単独

## ロンサーフ(TAS-102)

### 【適応】

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌（3次治療以降）

治癒切除不能な進行・再発の胃癌（2次治療以降）

### 【投与スケジュール】

	Day1		Day5		Day8		Day12		Day14		Day28
TAS102 35mg/m <sup>2</sup> /回 1日2回	→										
	→										

1日2回 朝・夕食後を5日間内服し、2日間休薬。これを2回繰り返し、その後14日間休薬する。  
4週を1コースとする。

### ※ロンサーフの投与量について

体表面積	通常量
1.07 m <sup>2</sup> 未満	35 mg/回 (70mg/日)
1.07 m <sup>2</sup> 以上 1.23 m <sup>2</sup> 未満	40 mg/回 (80mg/日)
1.23 m <sup>2</sup> 以上 1.38 m <sup>2</sup> 未満	45 mg/回 (90mg/日)
1.38 m <sup>2</sup> 以上 1.53 m <sup>2</sup> 未満	50 mg/回 (100mg/日)
1.53 m <sup>2</sup> 以上 1.69 m <sup>2</sup> 未満	55 mg/回 (110mg/日)
1.69 m <sup>2</sup> 以上 1.84 m <sup>2</sup> 未満	60 mg/回 (120mg/日)
1.84 m <sup>2</sup> 以上 1.99 m <sup>2</sup> 未満	65 mg/回 (130mg/日)
1.99 m <sup>2</sup> 以上 2.15 m <sup>2</sup> 未満	70 mg/回 (140mg/日)
2.15 m <sup>2</sup> 以上	75 mg/回 (150mg/日)

前コース（休薬期間を含む）中に、「減量基準」に該当する有害事象が発現した場合には、本剤の投与再開時において、コース単位で1日単位量として10mg/日単位で減量する。ただし、最低投与量は30mg/日までとする

※骨髄抑制が現れることがあるためDay21での血液検査が推奨されている。

### <ロンサーフの減量基準>

	減量基準
好中球	500/mm <sup>3</sup> 未満
血小板	50,000/mm <sup>3</sup> 未満