

ロンサーフ® +BV

TAS-102(ロンサーフ®) +BV(ベバシズマブ)

【適応】

治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸がん

【投与スケジュール】

	Day1	Day5	Day6・7	Day8	Day12	Day13・14	Day15	Day28
TAS-102 35 mg/m ² /回※ 1日2回	→			→				
BV 5mg/kg 90分かけて (初回)	↓						↓	

TAS-102は1日2回 朝・夕食後を5日間内服し、2日間休薬。これを2回繰り返し、その後14日間休薬する。4週を1コースとする。

BVは2週間ごとに点滴静注する。

※BVは初回90分かけて投与。Infusion Reaction等なければ、2回目以降、60分、30分と短縮可能。

※BVによる重度(Grade3以上)のInfusion reactionが現れた場合、本剤の投与を中止し、以降、本剤を投与しないこと。またGrade2以下のInfusion reactionが現れた場合は、投与速度を減じて慎重に投与すること。

※ロンサーフの投与量について

体表面積	通常量
1.07 m ² 未満	35 mg/回 (70mg/日)
1.07 m ² 以上 1.23 m ² 未満	40 mg/回 (80mg/日)
1.23 m ² 以上 1.38 m ² 未満	45 mg/回 (90mg/日)
1.38 m ² 以上 1.53 m ² 未満	50 mg/回 (100mg/日)
1.53 m ² 以上 1.69 m ² 未満	55 mg/回 (110mg/日)
1.69 m ² 以上 1.84 m ² 未満	60 mg/回 (120mg/日)
1.84 m ² 以上 1.99 m ² 未満	65 mg/回 (130mg/日)
1.99 m ² 以上 2.15 m ² 未満	70 mg/回 (140mg/日)
2.15 m ² 以上	75 mg/回 (150mg/日)

前コース(休薬期間を含む)中に、「減量基準」に該当する有害事象が発現した場合には、本剤の投与再開時において、コース単位で1日単位量として10mg/日単位で減量する。ただし、最低投与量は30mg/日までとする

※骨髄抑制が現れることがあるためDay21での血液検査が推奨されている。

<ロンサーフの減量基準>

	減量基準
好中球	500/mm ³ 未満
血小板	50, 000/mm ³ 未満